

Tests de Capacité Fonctionnelle de la Déglutition*

Nom du malade

D: départ du test épaissement 1 : 1 verre d'eau + 1 cuillerée de compote
 FR : fausse route épaissement 2 : 1 verre d'eau + 3 cuillerées de compote
 c. à c. : cuillère à café c. à s. : cuillère à soupe cc : centimètre cube

Date du test

test à l'eau

D 1/2 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à s. 4 fois si pas de FR passer à 1 gorgée 4 fois au verre ou à la paille 4 fois si pas de FR : hydratation per os eau pure	→ si FR, épaissir : →	<u>épaissement 1</u> 1/2 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à s. 4 fois si pas de FR passer à 1 gorgée 4 fois au verre ou à la paille 4 fois si pas de FR : hydratation per os eau épaissie 1	→ si FR, épaissir : →	<u>épaissement 2</u> 1/2 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à s. 4 fois si pas de FR passer à 1 gorgée 4 fois au verre ou à la paille 4 fois si pas de FR : hydratation per os eau épaissie 2	→ si FR, épaissir : →	<u>gélification</u> 1/2 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à s. 4 fois si pas de FR passer à hydratation per os eau gélifiée	→ si FR : STOP per os

D <u>aliment mixé</u> 1/2 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à <u>aliment mouliné</u> 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à s. 4 fois si pas de FR passer à <u>aliment en morceaux</u> 1 cc 4 fois si pas de FR passer à 2 cc 4 fois si pas de FR passer à reprise alimentaire en morceaux 2 cc	→ si FR, posture →	<u>posture flexion+rotation</u> 1/2 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à c. 4 fois si pas de FR passer à 1 c. à s. 4 fois si pas de FR passer à 1 cc 4 fois si pas de FR passer à 2 cc 4 fois si pas de FR passer à reprise alimentaire en morceaux 2 cc + posture	→ si FR →	stop alimentation , nutrition entérale totale alimentation de mixé à la 1/2 c. à c. alimentation de mixé à la c. à c. alimentation de mouliné à la c. à c. alimentation de mouliné à la c. à s. alimentation en morceaux 1 cc
---	--------------------	--	-----------	--

* Guatterie, Lozano 1997, unité de rééducation de la déglutition – USN Tastet Girard
 CHU Bordeaux